夏季高发且致命，注意防护蜚虫叮咬，中国蜚传脑炎最新的流行概况

每年夏季，一种叫蜚虫的虫子开始在全球的森林和草原区域横行无忌，通过叮咬人类与动物吸血生存，还会携带各种致命病菌传播给受害者，给人与动物造成严重伤害，蜚虫及其传播的疾病不仅给畜牧业带来经济损失，还对公共卫生和安全构成重大威胁(图 1)。

前阵子，一位浙江网友发帖记录了家人从被蜚虫咬，到发烧去世的全过程。

短短 7 天，人就没了。

该网友称，这名亲属经常在农村种菜，可能是在菜地被蜚虫咬的。

图 1. 致命蜚虫(来源深圳卫健委)

目前，全球已报告的蜱虫种类有 907 种，仅中国就鉴定出约 120 种，其中 80% 为硬蜱，由蜱虫叮咬传播的疾病叫**蜱媒传染病(蜱虫病, TBDs)**，该病在全世界分布广泛。据报道，蜱虫可携带 83 种病毒、14 种细菌、17 种螺旋体及 32 种原虫，蜱媒传染病多达 40 多种，比如**蜱传脑炎(森林脑炎)**、**莱姆病**、巴贝斯虫病、发热伴血小板减少综合征、Q 热、蜱传斑疹伤害等，有些疾病的死亡率高达 10%，每种疾病与蜱虫的种类和分布地区有关(图 2)。比如**莱姆病**主要是由黑脚蜱传播且在欧洲和北美最流行，巴贝斯虫病主要是伊克斯蜱传播，而**蜱传脑炎**主要在欧亚大陆的温带森林地区传播。

图 2. 可传播病毒的蜱虫(来源深圳卫健委)

由于中国极其复杂且丰富多彩的地貌环境，国内**蜱媒传染病(TBDs)**在国内的流行情况也极其复杂多变，每个区域的流行蜱和疾病都不一样，在中国最突出的 TBDs 是**莱姆病**、**蜱传脑炎(TBE)**、克里米亚-刚果出血热、Q 热、兔热病、北亚蜱传斑点热、人粒细胞无形体病和**严重发热伴血小板减少综合征**等。据最新的研究报道，肆虐欧亚大陆温带地区的**蜱传脑炎病毒(TBEV)**在中国的**蜱虫感染率为 5.8%**，**人类感染率为 9.0%**。TBEV 主要分三种型别：欧洲亚型(Eu-TBEV)、**远东亚型(Fe-TBEV)**和西伯利亚亚型(Sib-TBEV)，中国主要是**Fe-TBEV**，广泛分布于东北地区、新疆、云南和西藏等省份，其中东北地区主要的传播媒介是**硬**

蜱，而在新疆主要的传播媒介是**森林革蜱**，云南主要的传播媒介是卵形硬蜱。

目前在中国，蜱虫的 TBEV 感染率从 2000-2010 年的 4.8% 上升到 2011-2023 年的 6.3%，感染蜱虫主要分布在吉林省(13.4%)和内蒙古(4.5%)，**森林革蜱**的 TBEV 感染率最高(8.1%)。而中国人群的 TBEV 血清阳性率从 2000-2010 年的 4.7% 增加到 2011-2023 年的 17.6%，易感人群包括女性、林业工人、军人和农民，其中家庭主妇和失业者中的血清阳性率最高，不同省份的人群中血清阳性率差异较大，**新疆和黑龙江**人群阳性率最高，分别是 14.5% 和 13.6%(图 3)。

Table 1. Frequency of TBEV prevalence in ticks, and subgroup analysis.

Subgroup	Variables	No. Studies	No. Samples	No. Positive	Prevalence % (95%CI)	Z	Heterogeneity p	I ²
Species	<i>Dermacentor silvarum</i>	5	1680	181	8.1 (3.2-12.9)	4.317	0.000	0
	<i>Ixodes persulcatus</i>	14	8528	338	6.7 (5.0-8.5)	7.614	0.000	94.40%
	<i>Dermacentor nuttalli</i>	2	484	17	3.4 (1.9-5.0)	1.422	0.155	0
	<i>Hyalomma asiaticum kozlovi</i>	1	178	2	1.1 (-0.4-2.7)	3.260	0.001	86.70%
	<i>Ixodes ovatus</i>	1	717	2	0.3 (-0.1-0.7)	1.416	0.157	0
Sampling	2011-2023	13	9523	454	6.3 (4.7-7.8)	7.757	0.000	94.20%
	2000-2010	4	2184	89	4.8 (0.4-9.2)	2.151	0.031	96.30%
Province	Jilin	6	1753	221	13.4 (8.3-18.4)	3.304	0.000	84.50%
	Inner Mongolia	6	1379	69	4.5 (1.8-7.1)	5.177	0.000	89.70%
	Heilongjiang	8	7858	251	3.9 (2.5-5.4)	5.238	0.000	93.00%
	Yunnan	1	717	2	0.3 (-0.1-0.7)	1.416	0.000	0

Table 2. Frequency of TBEV seroprevalence in human serum, and subgroup analysis.

Subgroup	Variables	No. Studies	No. Samples	No. Positive	Prevalence % (95%CI)	Z	Heterogeneity p	I ²
Sampling	2011-2023	8	2533	400	17.6 (11.3-23.8)	5.506	0.000	94.80%
	2000-2010	13	4549	253	4.7 (2.9-6.4)	25.256	0.031	88.90%
Province	Xinjiang	4	894	142	14.5 (7.9-21.1)	4.297	0.000	87.60%
	Heilongjiang	4	1124	216	13.6 (1.6-25.6)	2.225	0.000	98.00%
	Inner Mongolia	2	1120	98	9.5 (5.6-13.4)	4.784	0.078	67.80%
	Jilin	4	1250	77	8.0 (3.3-12.8)	3.314	0.000	90.80%
	Tibet	2	1256	81	5.5 (1.4-9.6)	2.647	0.001	90.20%
	Guizhou	1	113	7	6.2 (1.8-10.6)	2.732	0.000	0
	Liaoning	2	234	2	0.8 (-0.3-0.2)	1.407	0.847	0.00%
	Yunnan	1	84	4	4.8 (0.2-9.3)	2.049	0.000	0
Gender	Male	6	1584	227	17.2 (10.0-24.3)	4.739	0.000	92.90%
	Female	4	549	122	22.5 (7.8-37.2)	3.006	0.003	94.10%
Occupation	Border guard	2	490	86	17.5 (14.2-20.9)	10.212	0.000	0
	Herdsmen	3	760	88	15.7 (0.4-31.0)	2.008	0.045	96.20%
	Forest worker	2	359	50	15.4 (-1.7-32.6)	1.761	0.078	94.80%
	Other	1	145	27	18.6 (12.3-25.0)	5.158	0.000	0

图 3. 中国蜱传脑炎病毒的流行情况(来源文献 1)

近年来，包括中国在内的欧洲和亚洲国家，TBE 感染病例数持续上升，TBE 不断出现的新流行趋势对欧亚地区的公共卫生构成了严重威胁，关于蜱传脑炎(森林脑炎)在欧洲地区的流行概况请查看上一篇文章《**每年 5-7 月高发，小小蜱虫能将青壮年咬成瘫痪？欧洲蜱传脑炎最新概况**》。目前在中国，蜱传脑炎(TBE)被列为法定职业病之一，但还不是法定报告的传染病，只有黑龙江省将其指定为省级法定报告的传染病。尽管目前国内其实际疾病负担尚不清楚，但是实际上

TBE 感染人数被认为比报告病例数要多的多。

TBE 的防治：目前尚无针对 TBE 的抗病毒治疗方法，但可接种疫苗进行保护，不过疫苗对于 60 岁以上的人群保护效果较低。关于 TBE 诊断，在脑脊液或其他体液中很少能通过 PCR 分子检测到 TBEV 基因组，因此 TBE 诊断主要依赖于血清学抗体检测方法，即通过检测血清和/或脑脊液中的 IgM 和 IgG 抗体(图 4)。

图 4. TBEV 在血清和脑脊液中的 IgM 水平随时间变化(来源文献 2)

文章来源：WHO、深圳卫健委、维润赛润资讯

文献 1: The Prevalence of Tick-Borne Encephalitis Virus in the Ticks and Humans of China from 2000 to 2023: A Systematic Review and Meta-Analysis [J]. *Vet. Sci.* 2025, 12, 146.

文献 2: Kinetics of tick-borne encephalitis virus IgM antibody responses in serum and cerebrospinal Fluid [J]. *INFECTIOUS DISEASES*, 2025, 1-11.

德国维润赛润蜱传病毒原料清单

病原体	产品名称	类别	应用	单位	货号
伯氏疏螺旋体 (莱姆病)	Borrelia afzelii 阿弗西尼疏螺旋体抗原	天然蛋白	免疫测定	mg	BA121VS
	Borrelia afzelii Pko DbpA 阿弗西尼疏螺旋体核心结合蛋白 A	重组蛋白	免疫测定	mg	BA121R01
	Borrelia afzelii Pko OspC 阿弗西尼疏螺旋体外膜蛋白 C	重组蛋白	免疫测定	mg	BA121R02
	Borrelia garinii 伽氏疏螺旋体抗原	天然蛋白	免疫测定	mg	BA121GVS
蜱传脑炎病毒 (森林脑炎)	Tick-borne encephalitis virus Envelope protein E 蜱传脑炎病毒包膜蛋白 E	重组蛋白	免疫测定	mg	BA112R01